

УДК: 636.5:636.083

ОПТИМІЗАЦІЯ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ БРОЙЛЕРІВ ЗА РОЗПОДІЛЬНОГО ЗА СТАТТЮ ВИРОЩУВАННЯ

Назаренко С.О. – к. с.-г. н., Херсонський ДАУ

Постановка проблеми. У м'ясному птахівництві доцільність роздільно-статевого вирощування птахів обумовлена різною швидкістю росту й різними строками досягнення забійного віку самців і самок. Як показала практика, розподільне вирощування самців і самок бройлерів сприяє збільшенню пристів живої маси й поліпшує показники збереженості курчат, особливо самок, а також зменшує витрати кормів на виробництво одиниці продукції. До моменту забою одностатеві курчата маютьвищу однорідність за живою масою, що погоджує їх обробку в забійному цеху [1].

Разом із тим, успіх вирощування бройлерів суттєво залежить від щільності посадки, що визначає ефективність використання виробничої площини. Однак, відсутність чітких рекомендацій фірми Cobb-Vantress Inc. щодо особливостей розподільного за статтю вирощування бройлерів та регулювання норми щільності посадки півників та курочок кросу Кобб-500 спонукало до проведення досліджень, метою яких було встановлення раціональної щільності посадки м'ясних курочок і півників на глибокій підстилці за розподільностатевого вирощування.

Стан вивчення проблеми. Для правильної оцінки щільності посадки беруть до уваги такі фактори, як клімат, тип пташника, передзабійну масу птахів, екологічне законодавство. Неправильно розрахована щільність посадки може привести до захворювання ніг, підвищеної смертності, розкльовування.

Диференціація щільності посадки залежно від віку та живої маси бройлерів – один із шляхів для зберігання оптимальної щільності посадки птахів. Вирощування бройлерів з регулюванням щільності посадки передбачає проріджування поголів'я шляхом відправлення частини поголів'я на забій або розсаджування на незайняту площину пташника. У деяких державах у пташник саджають курчат відразу з підвищеною щільністю і вирощують згідно з двома забійними стандартами. Після досягнення першого (нижнього) забійного стандарту від 20 до 50 % поголів'я направляють на забій для реалізації м'яса. Для таких птахів, які залишаються, з'являється додаткова площа, їх можна вирощувати до більш важкого стандарту живої маси [2, 3].

У світі використовують багато різних параметрів щільності посадки. Найбільш поширені значення знаходяться в діапазоні від 30 кг до 42 кг живої маси бройлерів на 1 м² площині. Слід зазначити, що у регіонах із жарким кліматом щільність посадки на рівні 30 кг/м² близька до ідеальної [4].

Завдання і методика досліджень. Науково-господарський дослід був проведений на бройлерній птахофабриці ЗАТ "Дружба народів Нова" Красногвардійського району АР Крим. Було сформовано одну контрольну і чотири дослідних групи бройлерів кросу Кобб-500 по 100 голів у кожній. Розподіл за статтю молодняку проводили в інкубаційному цеху під час вибірки і сортую-

вання добових курчат шляхом вентсексингу (оцінки розмірів та форми статевих горбиків).

Контрольну і дослідні групи курчат утримували в одному пташнику на глибокій підстилці, але в окремих секціях. Доступ до корму і води був вільним. Тривалість вирощування курчат становила 42 дні. Для годівлі використовували стандартні комбікорми, виготовлені на комбікормовому заводі. Параметри освітлення, температури, вологості і газового складу повітря в пташнику, фронту годівлі та напування бройлерів усіх груп відповідали зоотехнічним нормативам, рекомендованим фірмою-постачальником кросу Кобб-500. Загальна маса бройлерів у розрахунку на одиницю площи пташника складала максимум 39 кг. Цей норматив узято за основу регулювання щільності посадки курчат. Дослідження були проведені за схемою, поданою в таблиці 1.

Таблиця 1. – Схема досліджень

Номер групи	Щільність посадки		Спосіб вирощування	Голів у групі
1*	Диференційована	1....35 днів – 22 гол/м ² , 36....42 дні – 15 гол/м ²	Сумісне вирощування курочок і півників	100
2		1....42 дні – 13,5 гол/м ²	Півники за розподільнostатевого вирощування	100
3		1....42 дні – 16,5 гол/м ²	Курочки за розподільнostатевого вирощування	100
4		1....30 днів – 23 гол/м ² , 31....40 днів – 14 гол/м ² , 41....42 дні – 12 гол/м ²	Півники за розподільнostатевого вирощування	100
5		1....35 днів – 23 гол/м ² , 36....42 дні – 14 гол/м ²	Курочки за розподільнostатевого вирощування	100

Примітка: * – контрольна група.

Протягом дослідного періоду контролювали збереженість курчат дослідних і контрольної груп. Біометричну обробку даних проводили методами варіаційної статистики за Н.А. Плохинським [5] з використанням програми Microsoft Excel. Для визначення частки впливу організованих факторів на реалізацію генетичного потенціалу м'ясної продуктивності бройлерів застосовували метод однофакторного дисперсійного аналізу з використанням комп'ютерної програми Statistica 6.0.

Економічну ефективність вирощування бройлерів розраховували відповідно до "Методики визначення економічної ефективності використання у сільському господарстві результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій" [6]. В основу обчислення економічної ефективності було покладено виробництво м'яса за рік у розрахунку на одиницю виробничої площи.

Результати досліджень. Унаслідок проведених досліджень було встановлено, що до 6-тижневого віку приріст живої маси півників був більшим, ніж у курчат-бройлерів контрольної групи. Тому у 6-тижневому віці півники дослід-

ної групи достовірно ($P \geq 0,999$) перевершували не розсортовані за статтю бройлерів на 356 г, або на 15 %. Диференціал живої маси між півниками і не розсортованим за статтю м'ясним молодняком з віком збільшувався і досяг піку в кінці періоду вирощування (табл. 2).

Таблиця 2. – Динаміка живої маси бройлерів за розподільностатевого та сумісного вирощування

Вік	Сумісне вирощування півників і курочок (кон- трольна група)	Півники за розподіль- ного за статтю виро- щування		Курочки за розподі- льного за статтю ви- рощування
		Номер групи		
	I (n=100)	IV (n=100)	V (n=100)	
1 тиждень	162 ± 0,5	158 ± 0,9**	144 ± 0,5***	
2 тижні	372 ± 2,6	384 ± 2,7**	323 ± 1,7***	
3 тижні	785 ± 5,5	760 ± 5,0***	718 ± 4,1***	
4 тижні	1326 ± 11,1	1379 ± 9,2***	1308 ± 8,1	
5 тижнів	1739 ± 15,6	1970 ± 13,5***	1730 ± 13,1	
6 тижнів	2330 ± 22,8	2686 ± 19,3***	2406 ± 16,8*	

* Примітка: * – $P \geq 0,095$; ** – $P \geq 0,099$; *** – $P \geq 0,999$.

Починаючи з 4-го тижня життя, у курочок дослідної групи спостерігалося підвищення інтенсивності росту порівняно з курчатами контрольної групи. У 4-тижневому віці жива маса курочок була на меншою 18 г (або 1,4%), ніж у контрольної групи, але різниця була недостовірною. Це відставання за приростами живої маси у контрольній групі можна пояснити збільшенням диференціалу за живою масою на користь півників, встановленням домінуючого положення півників у стаді та пригнічення курочок. Ці фактори вплинули на споживання корму та інтенсивність росту курочок, яких вирощували разом із півниками. До 5-тижневого віку курочки дослідної групи також характеризувалися підвищеною інтенсивністю росту, їх середньодобові та абсолютні приrostи живої маси були більшими, ніж у не розсортованих за статтю бройлерів відповідно на 1,2 г і 8 г. Завдяки цьому у 35-добовому віці жива маса бройлерів дослідної та контрольної групи майже зрівнялася. Відставання курочок дослідної групи скоротилося до 0,5 %, що є несуттєвим.

Отже, розподільностатеве вирощування бройлерів забезпечує підвищення інтенсивності росту молодняку, достовірне збільшення живої маси на час зняття з вігодівлі на 356 г (або на 15%) у півників, та на 76 г (або на 3,3%) – у курочок. Вирощування бройлерів, що розподілені за статтю, сприяє підвищенню однорідності стада м'ясного молодняку на 13,7 % у півників та на 14,9 % – у курочок, а також збереженості бройлерів на 2,3 % порівняно з сумісним вирощуванням курчат обох статей.

Був проведений аналіз впливу стабільної та диференційованої щільноті посадки на ріст, розвиток і життєздатність курочок-бройлерів. Дослідженнями встановлено, що підвищена щільність посадки півників на глибокій підстилці обумовлює достовірне ($P \geq 0,999$) зниження живої маси бройлерів на 220 г у 6-тижневому віці. Однак, застосування диференційованої щільноті посадки півників суттєво не впливає на показники збереженості та однорідності стада (табл. 3).

Таблиця 3. – Вплив стабільної та диференційованої щільності посадки на динаміку живої маси бройлерів

Вік	Pівники за стабільної щільності посадки	Pівники за диференційованої щільності посадки	Курочки за стабільної щільності посадки	Курочки за диференційованої щільності посадки
	Номер групи			
	II (n=100)	IV (n=100)	III (n=100)	V (n=100)
1 тиждень	168 ± 0,7***	158 ± 0,9	154 ± 0,3***	144 ± 0,5
2 тижні	424 ± 2,2***	384 ± 2,7	349 ± 2,3***	323 ± 1,7
3 тижні	835 ± 4,0***	760 ± 5,0	795 ± 3,2***	718 ± 4,1
4 тижні	1500 ± 9,5***	1379 ± 9,2	1418 ± 9,9***	1308 ± 8,1
5 тижнів	2313 ± 12,7***	1970 ± 13,5	1962 ± 11,6***	1730 ± 13,1
6 тижнів	2906 ± 17,9***	2686 ± 19,3	2483 ± 16,0**	2406 ± 16,8

* Примітка: * – $P \geq 0,095$; ** – $P \geq 0,099$; *** – $P \geq 0,999$.

Дослідження показали, що підвищена щільність посадки курочок на глибокій підстилці обумовлює достовірне ($P \geq 0,999$) зниження живої маси бройлерів на 76 г у 6-тижневому віці. Однак, застосування диференційованої щільності посадки курочок не має негативного впливу на показники збереженості та однорідності стада. Крім того, дисперсійним аналізом підтверджено значний вплив факторів щільності посадки та статі курчат на величину живої маси. Доведено, що півники-бройлери більш чутливі до щільності посадки, ніж курочки. Диференційована щільність посадки обумовлює достовірне зниження інтенсивності росту тіла бройлерів у довжину у перші три тижні життя, але негативний вплив підвищеної щільності посадки у ранньому віці нівелюється в подальшому за рахунок розрідження поголів'я у 30-35-добовому віці та прояву компенсаторного росту.

Щільність посадки птахів у пташнику суттєво впливає на економічну ефективність виробництва м'яса бройлерів, тому одним із завдань нашої роботи було підвищення ефективності використання виробничої площини. Встановлено, що питома кількість живої маси, що припадала на одиницю площини, у IV та V дослідних групах була більшою порівняно з контрольною групою, що свідчить про підвищення ефективності використання площин пташника і доцільність застосування ущільненої посадки бройлерів з нормативом 39 кг живої маси на 1 м² площині (табл. 4).

Таблиця 4. – Відносна кількість живої маси бройлерів, що припадає на одиницю (1 м²) корисної площині підлоги пташника

Вік, діб	Номер групи				
	I	II	III	IV	V
7	3,57	2,27	2,54	3,64	3,31
14	8,19	5,73	5,76	8,84	7,44
21	17,27	11,27	13,11	17,47	16,52
28	29,18	20,24	23,39	31,72	30,09
30	30,06	23,28	25,95	38,08*	32,86
35	36,53*	31,23	32,38	27,58	39,78*
40	32,42	36,58	38,07	30,90*	30,98
42	34,95	38,72	40,35	32,23	33,69

Таким чином, застосування розподільностатевого вирощування курочок та півників-бройлерів за диференційованої щільності посадки забезпечує збільшення виробництва м'яса у забійній масі у розрахунку на одиницю площини пташника за рік на 9,72 кг. Надбавка основної продукції складає 4,95 %. За рахунок цього буде отримано додаткового прибутку на птахофабриці 20,78 млн. грн. Таким чином, технологічний прийом роздільностатевого вирощування бройлерів біологічно доцільний та економічно віправданий.

Висновки та пропозиції. Проведені дослідження і розрахунки дають можливість зробити висновок, що використання на птахофабриці ЗАТ "Дружба народів Нова" Красногвардійського району АР Крим розподільного за статтю вирощування бройлерів забезпечує підвищення їх м'ясної продуктивності, збереженості та однорідності за живою масою.

Для збільшення виробництва м'яса бройлерів у господарстві пропонується вирошувати розподілених за статтю курчат з диференційованою щільністю посадки. Півників у перші 30 діб вирошувати з щільністю посадки 23 гол/м², від 31-ї до 40-ї доби – 14 гол/м², і до кінця вирощування – 12 гол/м². Курочок у перші 35 діб вирошувати з щільністю посадки 23 гол/м², від 36-го дня і до кінця вирощування – 14 гол/м². З метою прорідження поголів'я пропонується застосовувати забій 38...40 % поголів'я півників-бройлерів у 30-добовому віці з живою масою не менше 1500 г, а також 14...15 % поголів'я у 40-добовому віці. Для прорідження поголів'я курочок-бройлерів пропонується проводити забій 38...40 % поголів'я у 35-добовому віці.

Перспектива подальших досліджень. У подальших дослідженнях важливим питанням є порівняльна оцінка якості тушок курчат-бройлерів, вирощених за традиційною технологією, а також за розподільностатевого вирощування з диференційованою та стабільною щільністю посадки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Рубан Б.В. Ритмы роста и развития птицы // Ефективне птахівництво. – 2006. – № 6(18). – С.20-22.
2. Буяров В., Бородин В., Фролова Г. Ресурсозберегающие приемы выращивания бройлеров // Животноводство России. – 2007. – №8. – С.15-16.
3. Елизаров Е. Раздельное по полу выращивание бройлеров / Елизаров Е., Манукян В. // Птицеводство. – 2006. - № 11. – С. 12.
4. Буяров В. Откорм бройлеров: разные сроки и параметры // Птицеводство. – 2004. – № 11. – С.2-4.
5. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 236с.
6. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М., 1986. – 156 с.

УДК: 338.431.6:637.4: (477.72)

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ НА ПТАХОФАБРИЦІ ПАТ "ЧОРНОБАЙВСЬКЕ"

*Назаренко С.О. – к. с.-г. н., доцент, Херсонський ДАУ
Ніколаєва Ю. В. – магістр-дослідник, Херсонський ДАУ*

Постановка проблеми. Птахівництво є однією з найважливіших галузей продуктивного тваринництва, що займає важоме місце в народному господарстві сучасного світу. Поглиблена спеціалізація виробництва, що на сьогодні є характерним для птахівництва, дає змогу успішно впроваджувати комплексну механізацію і автоматизацію виробничих процесів і прогресивні технології, які базуються на рівномірному протягом року виробництві продукції, ефективніше використовувати продуктивний потенціал птиці, забезпечити ріст валової та товарної продукції при мінімальних трудових і матеріальних затратах [1].

Стан вивчення проблеми. У птахівництві України впроваджуються нові технології утримання, годівлі, ветеринарно-профілактичні та екологічні заходи, тобто відбуваються комплексні кількісні та якісні зміни, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності даної галузі.

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної птахівницької продукції варто повсюдно впроваджувати глибоку переробку птиці й розширити асортименти виробів з яєць і м'яса відповідно до вимог ринку. Одночасно потрібно працювати над попитом поліпшення не тільки товарного вигляду, але й поживної цінності продуктів птахівництва, що виготовляються (м'ясо і яєць) [4].

М'ясо, яйця й продукти переробки птиці є джерелами повноцінних білків, жирів, вітамінів, мінеральних і екстрактивних речовин, що відіграють важливу роль у життєдіяльності організму. Якість продукції, її екологічна безпека набувають усе більшого значення, тому продукти, отримані з птиці з низькими споживчими й харчовими властивостями, є неконкурентоспроможними. В умовах ринку підприємства повинні виробляти продукцію, орієнтуючись за вартістю і формуватися в регіоні споживача: високо-, середньо- і низькооплачуваного. Правильне вирошування, повноцінна годівля птиці, виконання й перевиконання нормативів по виходу продукції вирішальним образом позначаються на економіці підприємства [3].

Завдяки правильному веденню галузі можна в короткий термін збільшити виробництво яєць і м'яса, а також підвищити рівень забезпеченості населення цими продуктами.

Важлива роль у підвищенні продуктивності птиці й розвитку промислового птахівництва належить племінним і репродуктивним господарствам, які повинні постійно вдосконювати високопродуктивні лінії й кроси сільськогосподарського птиці, які найбільш пристосовані до інтенсивних умов утримання.

В інтенсифікації птахівництва особлива роль належить комплексній механізації, яка дозволяє впроваджувати прогресивні методи утримання птиці, проводити всі роботи в оптимальні строки, підвищувати їх якість, знижувати витрати праці виробництва на одиницю продукції [2].